Direzione Sanitaria
Tel. 0342521363 Fax 0342521951 email: direzione.sanitaria@asst-val.it
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio
Direttore: Dott.ssa Giuseppina Ardemagni

# Indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE)

In ottemperanza alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) che stabilisce all'art.1 comma 552 l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità in coerenza con il Programma Nazionale valutazione Esiti (PNE), dandone visibilità attraverso la pubblicazione annuale, si presentano i risultati del Programma Nazionale Esiti 2021 riferiti all'anno 2020, resi disponibili sul sito https://pne.agenas.it/.

Le tabelle seguenti si riferiscono a:

1. indicatori di volume di prestazioni/trattamenti, misurano il numero di prestazioni eseguite per tipologia.
2. indicatori di esito e di processo, misurano il tasso di complicanze/decessi/re interventi dopo trattamento (es. mortalità a 30 giorni da episodio di infarto); il tasso di utilizzo di alcuni trattamenti oggetto di monitoraggio (es. tasso di taglio cesareo); i tempi di attesa. Si segnala che alcuni indicatori di processo/esito, come quelli di area perinatale o la mortalità a 30 giorni per intervento di tumore maligno, sono calcolati su base pluriennale.

## INDICATORI DI VOLUME- anno 2020

*PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO*

| indicatore | numero prestazioni |
|---|---|
| Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri in età pediatrica | 8 |
| AIDS: volume di ricoveri | 3 |
| Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri | 16 |
| Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri | 4 |
| Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica | 21 |
| Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in età pediatrica | 7 |
| Arteriopatie (II - IV stadio): volumi di interventi | 86 |
| Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri | 3 |
| BPCO: volume di ricoveri ordinari | 22 |
| Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri | 13 |

| indicatore | numero prestazioni |
|---|---|
| Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri | 87 |
| Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri | 87 |
| Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri | 15 |
| Colecistectomia totale: volume di ricoveri | 102 |
| Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri | 14 |
| Frattura del collo del femore: volume di ricoveri | 217 |
| Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici | 202 |
| Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri | 46 |
| Ictus ischemico: volume di ricoveri | 107 |
| IMA a sede non specificata: volume di ricoveri | 3 |
| IMA: volume di ricoveri | 207 |
| Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri | 7 |
| Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri | 63 |
| Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie | 18 |
| Intervento chirurgico per TM cavo orale: volume di ricoveri | 2 |
| Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia | 19 |
| Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri | 37 |
| Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri | 2 |
| Intervento chirurgico per TM laringe (open ed endoscopico): volume di ricoveri | 19 |
| Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri | 7 |
| Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri | 98 |
| Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri | 10 |
| Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri | 4 |
| Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri | 10 |
| Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri | 14 |
| Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale | 5 |
| Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri | 19 |
| Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia | 6 |
| Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri | 12 |
| Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri | 11 |
| Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri | 1 |
| Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri | 27 |
| Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri | 6 |
| Intervento chirurgico sull'orecchio medio: volume di ricoveri | 7 |
| Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri | 118 |

| indicatore | numero prestazioni |
|---|---|
| Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri | 6 |
| Isterectomia: volume di ricoveri | 77 |
| N-STEMI: volume di ricoveri | 75 |
| Parti con taglio cesareo: volume di ricoveri | 175 |
| Parti: volume di ricoveri | 626 |
| Prostatectomia: volume di ricoveri | 58 |
| PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto | 250 |
| PTCA in pazienti NSTEMI: volume di ricoveri | 46 |
| PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri | 116 |
| PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica | 415 |
| Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri | 32 |
| Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia | 36 |
| Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica | 5 |
| Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri | 41 |
| Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri | 119 |
| Scompenso cardiaco: volume di ricoveri | 151 |
| STEMI: volume di ricoveri | 129 |
| Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri in eta' pediatrica | 10 |
| Tonsillectomia: volume di ricoveri | 39 |
| Tonsillectomia: volume di ricoveri in eta' pediatrica | 15 |
| Volume di ricoveri per embolia polmonare | 117 |
| Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti | 9 |

*PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO*

| indicatore | numero prestazioni |
|---|---|
| AIDS: volume di ricoveri | 3 |
| Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri | 4 |
| Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri | 1 |
| Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica | 8 |
| Arteriopatie (II - IV stadio): volumi di interventi | 43 |
| Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri | 17 |
| BPCO: volume di ricoveri ordinari | 63 |
| Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri | 57 |

| indicatore | numero prestazioni |
|---|---|
| Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri | 57 |
| Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri | 13 |
| Colecistectomia totale: volume di ricoveri | 70 |
| Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri | 10 |
| Frattura del collo del femore: volume di ricoveri | 52 |
| Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici | 40 |
| Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri | 16 |
| Ictus ischemico: volume di ricoveri | 25 |
| IMA a sede non specificata: volume di ricoveri | 2 |
| IMA: volume di ricoveri | 7 |
| Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie | 3 |
| Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri | 1 |
| Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia | 6 |
| Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri | 13 |
| Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri | 1 |
| Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri | 35 |
| Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri | 1 |
| Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri | 2 |
| Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri | 5 |
| Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale | 5 |
| Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri | 2 |
| Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia | 1 |
| Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri | 1 |
| Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri | 2 |
| Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri | 2 |
| Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri | 2 |
| Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri | 126 |
| Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri | 56 |
| Isterectomia: volume di ricoveri | 17 |
| Parti con taglio cesareo: volume di ricoveri | 27 |
| Parti: volume di ricoveri | 148 |
| Prostatectomia: volume di ricoveri | 7 |
| Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri | 3 |
| Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia | 8 |
| Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri | 8 |
| Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri | 31 |

| indicatore | numero prestazioni |
|---|---|
| Scompenso cardiaco: volume di ricoveri | 40 |
| STEMI: volume di ricoveri | 5 |
| Volume di ricoveri per embolia polmonare | 83 |
| Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti | 4 |

*PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA*

| indicatore | numero prestazioni |
|---|---|
| Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica | 3 |
| Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in età pediatrica | 1 |
| BPCO: volume di ricoveri ordinari | 4 |
| Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri | 2 |
| Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri | 32 |
| Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri | 32 |
| Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri | 2 |
| Colecistectomia totale: volume di ricoveri | 34 |
| IMA a sede non specificata: volume di ricoveri | 2 |
| IMA: volume di ricoveri | 2 |
| Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri | 1 |
| Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri | 32 |
| Scompenso cardiaco: volume di ricoveri | 32 |
| Volume di ricoveri per embolia polmonare | 8 |

# INDICATORI DI ESITO E PROCESSO – anno 2020

*PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO*

| indicatore | numero prestazioni/ interventi | % grezza | % aggiustata | RR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro due giorni (struttura di ricovero) | 112 | 91.07 | 87.87 | 1.15 | 0 |
| Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni | 26 | 0 | - | - | - |
| Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni | 26 | 0 | - | - | - |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni | 182 | 8.79 | 9.46 | 1.15 | 0.591 |
| Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni | 95 | 8.42 | 10.54 | 0.92 | 0.822 |
| Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg | 74 | 20.27 | 19.69 | 1.47 | 0.1 |
| Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery | 59 | 18.64 | 17.87 | 0.77 | 0.355 |
| Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio | 801 | 0.62 | 0.64 | 1.12 | 0.806 |
| Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni | 13 | 0 | - | - | - |
| Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni | 75 | 12 | 13.87 | 1.25 | 0.511 |
| Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni | 70 | 5.71 | 6.06 | 0.83 | 0.708 |
| BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni | 17 | 0 | - | - | - |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale) | 175 | 7.43 | 8.2 | 1.09 | 0.759 |
| Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni | 58 | 67.24 | 68.38 | 0.87 | 0.116 |
| Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni | 35 | 2.86 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni | 7 | 28.57 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni | 6 | 0 | - | - | - |
| BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni | 17 | 5.88 | - | - | - |
| Taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio | 274 | 0 | - | - | - |
| Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni | 18 | 5.56 | - | - | - |
| Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni | 7 | 0 | - | - | - |
| Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero | 6 | 0 | - | - | - |
| Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero | 6 | 16.67 | - | - | - |
| Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero | 10 | 40 | - | - | - |

| indicatore | numero prestazioni/ interventi | % grezza | % aggiustata | RR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni | 160 | 2.5 | 2.57 | 1.17 | 0.841 |
| Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia | 22 | 4.54 | - | - | - |
| Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero | 63 | 9.52 | 10.73 | 0.72 | 0.42 |
| Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella | 63 | 6.35 | 7.12 | 1.15 | 0.777 |
| Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare | 73 | 12.33 | 13.36 | 1.24 | 0.523 |
| Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare | 71 | 4.22 | 4.59 | 0.5 | 0.226 |
| Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella | 18 | 22.22 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi | 98 | 74.49 | - | - | - |
| Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella | 65 | 6.15 | 6.95 | 1.19 | 0.716 |
| Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui | 98 | 0 | - | - | - |
| Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni | 158 | 3.8 | 4.1 | 3.42 | 0.092 |
| Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui | 87 | 0 | - | - | - |
| Proporzione di episiotomie nei parti vaginali | 446 | 9.42 | 9.2 | 0.67 | 0.006 |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Con nuove variabili | 182 | 8.79 | 9.83 | 1.19 | 0.518 |
| STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti da accesso in struttura di ricovero | 112 | 70.54 | 67.99 | 1.36 | 0 |
| STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale trattati con PTCA entro 12 ore da accesso in struttura di ricovero | 93 | 84.95 | 84.55 | 1.18 | 0 |
| Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore da accesso in struttura di ricovero | 168 | 54.17 | 52.86 | 1.05 | 0.506 |
| Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - Con nuove variabili | 13 | 0 | - | - | - |
| Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili | 63 | 6.35 | 7.3 | 1.18 | 0.737 |

| indicatore | numero prestazioni/ interventi | % grezza | % aggiustata | RR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - Con nuove variabili | 18 | 22.22 | - | - | - |
| Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili | 65 | 6.15 | 7.05 | 1.21 | 0.693 |
| Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo | 68 | 30.88 | - | - | - |
| Proporzione di parti con taglio cesareo primario | 507 | 22.48 | 24.01 | 1.06 | 0.529 |
| Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni | 156 | 3.2 | 3.4 | 0.53 | 0.162 |
| Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro due giorni | 168 | 64.29 | 63.1 | 0.98 | 0.698 |
| Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni | 16 | 0 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni | 8 | 0 | - | - | - |
| Intervento di artroscopia del ginocchio: re intervento entro 6 mesi | 12 | 8.33 | - | - | - |
| Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni | 89 | 3.37 | 3.22 | 0.81 | 0.707 |
| Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento | 119 | 0 | - | - | - |
| Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni | 5 | 0 | - | - | - |
| Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento | 46 | 0 | - | - | - |
| Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni | 13 | 0 | - | - | - |
| Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni | 182 | 73.63 | 71.14 | 1.35 | 0 |
| Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni | 39 | 12.82 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni | 71 | 7.04 | 6.8 | 1.58 | 0.337 |
| Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni | 33 | 0 | - | - | - |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno | 184 | 4.35 | 5.14 | 0.56 | 0.108 |
| Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno | 184 | 19.02 | 21.63 | 1.15 | 0.346 |

| indicatore | numero di interventi | mediana | mediana nazionale |
|---|---|---|---|
| Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico | 38 | 4 | 4 |
| Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria | 19 | 8 | 7 |

*PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO*

| indicatore | numero prestazioni/ interventi | % grezza | % aggiustata | RR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro due giorni (struttura di ricovero) | 1 | 0 | - | - | - |
| Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni | 3 | 0 | - | - | - |
| Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni | 3 | 0 | - | - | - |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni | 3 | 33.33 | - | - | - |
| Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni | 28 | 17.86 | - | - | - |
| Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg | 26 | 7.69 | - | - | - |
| Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery | 31 | 0 | - | - | - |
| Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio | 354 | 0.56 | 0.57 | 0.98 | 0.983 |
| Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni | 4 | 0 | - | - | - |
| Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni | 16 | 18.75 | - | - | - |
| Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni | 13 | 15.38 | - | - | - |
| BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni | 50 | 10 | 11.48 | 0.9 | 0.809 |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale) | 2 | 0 | - | - | - |
| Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni | 31 | 38.71 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni | 34 | 0 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni | 5 | 0 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni | 1 | 0 | - | - | - |
| BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni | 47 | 6.38 | - | - | - |
| Taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio | 84 | 1.19 | - | - | - |
| Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni | 8 | 0 | - | - | - |
| Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro sei mesi dal ricovero | 36 | 11.11 | 12.88 | 2.68 | 0.04 |
| Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero | 36 | 13.89 | 13.86 | 0.83 | 0.662 |
| Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero | 38 | 5.26 | 7.02 | 0.47 | 0.291 |
| Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni | 78 | 0 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia | 16 | 0 | - | - | - |

| indicatore | numero prestazioni/ interventi | % grezza | % aggiustata | RR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero | 10 | 30 | - | - | - |
| Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella | 37 | 0 | - | - | - |
| Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare | 49 | 2.04 | - | - | - |
| Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare | 48 | 14.58 | - | - | - |
| Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella | 6 | 33.33 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi | 35 | 80 | - | - | - |
| Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella | 33 | 3.03 | 3.22 | 0.55 | 0.549 |
| Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui | 35 | 0 | - | - | - |
| Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni | 78 | 1.28 | - | - | - |
| Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui | 57 | 0 | - | - | - |
| Proporzione di episiotomie nei parti vaginali | 120 | 3.33 | 3.27 | 0.24 | 0.003 |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Con nuove variabili | 3 | 33.33 | - | - | - |
| STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti da accesso in struttura di ricovero | 1 | 0 | - | - | - |
| Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore da accesso in struttura di ricovero | 29 | 44.83 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - Con nuove variabili | 4 | 0 | - | - | - |
| Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili | 37 | 0 | - | - | - |
| Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - Con nuove variabili | 6 | 33.33 | - | - | - |
| Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - Con nuove variabili | 33 | 3.03 | 3.4 | 0.58 | 0.586 |

| indicatore | numero prestazioni/ interventi | % grezza | % aggiustata | RR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo | 13 | 38.46 | - | - | - |
| Proporzione di parti con taglio cesareo primario | 134 | 11.94 | - | - | - |
| Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni | 28 | 7.14 | - | - | - |
| Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro due giorni | 29 | 51.72 | - | - | - |
| Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni | 28 | 0 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni | 40 | 2.5 | - | - | - |
| Intervento di artroscopia del ginocchio: re intervento entro 6 mesi | 67 | 1.49 | - | - | - |
| Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni | 99 | 1.01 | 1.23 | 0.31 | 0.236 |
| Intervento di protesi di anca: revisione entro due anni dall'intervento | 157 | 0.64 | 0.65 | 0.35 | 0.29 |
| Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni | 38 | 0 | - | - | - |
| Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro due anni dall'intervento | 58 | 3.45 | 3.67 | 1.41 | 0.619 |
| Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni | 12 | 0 | - | - | - |
| Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro due giorni | 3 | 0 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni | 16 | 6.25 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni | 40 | 7.5 | - | - | - |
| Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni | 9 | 0 | - | - | - |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno | 5 | 20 | - | - | - |
| Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno | 5 | 0 | - | - | - |

| INDICATORE | numero interventi | mediana | mediana nazionale |
|---|---|---|---|
| Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico | 10 | 6 | 4 |
| Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria | 6 | 7 | 7 |

*PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA*

| indicatore | numero prestazioni/ interventi | % grezza |
|---|---|---|
| Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: complicanze a 30 giorni | 2 | 0 |
| Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro intervento a 30 giorni | 2 | 0 |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni | 2 | 0 |
| Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni | 22 | 13.64 |
| Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg | 16 | 6.25 |
| Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery | 25 | 8 |
| BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni | 4 | 0 |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale) | 2 | 0 |
| Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni | 25 | 76 |
| BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni | 4 | 0 |
| Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni | 3 | 0 |
| Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni | 1 | 100 |
| Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni | 51 | 1.96 |
| Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero | 37 | 13.51 |
| Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare | 5 | 0 |
| Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare | 5 | 20 |
| Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni | 51 | 0 |
| Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui | 32 | 0 |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - Con nuove variabili | 2 | 0 |
| Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni | 2 | 0 |
| Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni | 1 | 0 |
| Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni | 9 | 0 |
| Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni | 4 | 0 |
| Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno | 5 | 40 |
| Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno | 5 | 20 |

Legenda:

% aggiustata: il Programma Nazionale Esiti fornisce, avvalendosi di metodi di risk adjustment, il valore della percentuale per Presidio Ospedaliero aggiustata (% ADJ) ovvero calcolata al netto di fattori come l'età, il genere, la gravità della patologia in studio, la presenza di comorbidità croniche etc. che possono influenzare e modificare il risultato finale. L'aggiustamento permette di fare delle valutazioni comparative tra i Presidi, o tra il Presidio e la media nazionale, il più possibile depurate dal possibile effetto confondente dato dalla disomogenea distribuzione delle caratteristiche dei pazienti che rappresentano il bacino di utenza delle diverse strutture sanitarie.

Rischio relativo: esprime il rapporto tra il rischio aggiustato (%aggiustata) del presidio ospedaliero di riferimento e il rischio calcolato a livello nazionale, utilizzato come valore di benchmark (confronto). Il RR esprime l'eccesso (o il difetto) di rischio del gruppo posto al numeratore (presidio ospedaliero) rispetto al gruppo posto al denominatore (media nazionale).

P value: esprime la probabilità che il rischio aggiustato del presidio differisca da quello nazionale solo per effetto del caso: un valore basso (inferiore a 0.05) indica che le differenze non sono imputabili esclusivamente all'effetto del caso, ovvero si possono ritenere statisticamente significative; un valore prossimo all'unità indica invece che i due valori non sono significativamente diversi.

La percentuale (%) aggiustata, il rischio relativo ed il p value sono calcolati solo se l'indicatore supera la soglia di numerosità minima prevista dal PNE.