

ORARI DI VISITA

• REPARTO DI OSTETRICIA E NIDO - SONDRIO:

Giorni feriali dalle 11:00 alle 12:00

dalle 17:00 alle 18:30

Giorni festivi dalle 11:00 alle 12:00

dalle 16:00 alle 18:30

dalle 20:00 alle 21:00

Ingresso libero h24 per i papà o per i caregiver di riferimento delle donne.

• REPARTO DI OSTETRICIA E NIDO - SONDALO:

Tutti i giorni dalle 14:00 alle 21:00

Ingresso libero h24 per i papà o per i caregiver di riferimento delle donne.

• REPARTO DI PEDIATRIA - SONDRIO:

Tutti i giorni dalle 16:00 alle 18:00 per 40 minuti

E' garantita la presenza continuativa di un genitore durante la degenza.

• REPARTO DI NEONATOLOGIA – SONDRIO:

Ingresso libero h24 per i genitori.

STAFF

S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Direttore f.f.: Dott. Francesco Delzotti

Referente Ostetrico P.O. Sondrio: Federica Ponti

Coordinatore P.O. Sondalo: Carla Foppoli

S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA

Direttore: Dr.ssa Lorella Rossi

Responsabile Neonatologia: Dr. Emilio Palumbo

Coordinatore: Daniela Paventi

UBICAZIONE:

OSTETRICIA - SALA PARTO - NIDO:

P.O. Sondrio: Padiglione Nord, 3° piano

P.O. Sondalo: IV° Padiglione, piano -1

PEDIATRIA – NEONATOLOGIA:

P.O. Sondrio: Padiglione Sud, 3° piano

CONTATTI

Reparto Ostetricia Sondrio: Tel. 0342521220

Referente Ostetrico Sondrio: Tel. 0342521158

Reparto Ostetricia Sondalo: Tel. 0342808363

Reparto Pediatria Sondrio: Tel. 0342521316

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
della Valtellina e dell'Alto Lario

**DIPARTIMENTO MATERNO-
INFANTILE**

*S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA*

INFORMAZIONI AI VISITATORI PER PATOLOGIE RESPIRATORIE



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

I SINTOMI DELL'INFLUENZA




- I sintomi dell'Influenza sono: febbre accompagnata da almeno uno dei seguenti sintomi/segni: tosse, mal di gola, raffreddore, mal di testa, dolori muscolari e articolari, brividi, debolezza, vomito, diarrea.
- La trasmissione dell'Influenza avviene principalmente ad opera delle goccioline diffuse attraverso la tosse o gli starnuti e può anche essere trasmessa attraverso il contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie contaminate.
- Per la riduzione del rischio di infezione la misura da raccomandare maggiormente è **lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone**, o in assenza di questi, con soluzioni detergenti a base di alcol.

Quando non è possibile mantenere la distanza e ridurre il tempo di contatto stretto con persone malate è consigliato evitare di toccarsi occhi, naso e bocca. I virus possono diffondersi quando una persona tocca qualsiasi superficie contaminata da virus e poi si tocca occhi, naso e bocca.

Sebbene tali gesti siano sottovalutati, essi rappresentano sicuramente gli interventi preventivi di prima scelta, e sono pratiche riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le più efficaci per il controllo della diffusione delle infezioni, anche negli Ospedali.

RACCOMANDAZIONI PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

L'esecuzione del test per SARS-CoV-2 è prevista nei seguenti casi:



- pazienti ricoverati o che devono essere trasferiti, anche se asintomatici (*non previsto per i ricoveri in regime di Day Hospital / Day Surgery e per le prestazioni Ambulatoriali*)
- pazienti che presentano sintomi compatibili con COVID-19
- pazienti che all'anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19 negli ultimi 5 giorni
- caregiver di pazienti COVID-19 positivi (*proposto a tutti i caregiver*)

Le raccomandazioni sono soggette a variazioni in base all'andamento clinico-epidemiologico del COVID-19 e alle indicazioni ministeriali



E' fortemente raccomandato l'uso della mascherina per visitatori e pazienti ad eccezione dei bambini con età inferiore ai 6 anni.

INFORMAZIONI AI VISITATORI

Chiediamo la vostra gentile collaborazione nel:

1. Rispettare gli orari di visita dei reparti: le visite fuori orario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore infermieristico/ostetrico
2. Non affollare le camere di degenza: è ammesso 1 visitatore per volta per paziente
3. Lavarsi sempre le mani prima e dopo ogni contatto con il paziente, secondo le raccomandazioni dell'OMS
4. Attenersi alle indicazioni fornite dal personale lasciando la camera di degenza se richiesto
5. Non sedersi sui letti e limitare il contatto con oggetti personali del paziente

Per mettere in pratica una buona igiene respiratoria è consigliabile:

1. coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce
2. usare fazzoletti monouso
3. smaltirli subito e correttamente nel cestino e lavarsi le mani
4. evitare il contatto stretto con persone ammalate, mantenendo una distanza di almeno un metro da chi presenta sintomi dell'influenza ed evitando posti affollati
5. utilizzare la mascherina chirurgica: in presenza di sintomatologia influenzale può ridurre le infezioni tra i contatti stretti.

