



## PROVA SCRITTA N. 1

### 1. Oltre alla glicemia, quali sono i segni e i sintomi del diabete mellito?

- A) Polidipsia, poliuria, astenia, perdita di peso, pelle secca, aumentata frequenza di infezioni;
- B) Polidipsia, poliuria, astenia, febbre;
- C) Polidipsia, poliuria, astenia, perdita di peso, pelle secca, algie diffuse;

### 2. Da chi è fortemente raccomandato l'allattamento al seno?

- A) OMS, UNICEF, Ministero della Salute;
- B) Ministero della Salute;
- C) PLS (Pediatri di Libera Scelta);

### 3. La prevenzione primaria a chi è rivolta?

- A) Soggetto sano;
- B) Soggetto sintomatico;
- C) Soggetto malato;

### 4. Per disinfezione si intende:

- A) La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni;
- B) Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti;
- C) Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microorganismi viventi e d'altri agenti biologici, comprese le spore;

### 5. Il paziente con ritenzione urinaria ha:

- A) Calcoli renali o vescicali;
- B) Normale produzione di urina e mancata minzione;
- C) Minzioni frequenti, ma scarse;

### 6. La sistematica e corretta misurazione del dolore che cosa permette?

- A) Ottenere informazioni sulla qualità e le caratteristiche del dolore;
- B) Verificare l'impatto del dolore sulla qualità di vita del paziente;
- C) Entrambe le precedenti;

### 7. La responsabilità professionale si divide in:

- A) Penale e civile;
- B) Civile e disciplinare;
- C) Penale, civile, amministrativa e disciplinare;

### 8. L'esame dell'Emoglobina Glicosilata fornisce indicazioni relative:

- A) Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico;
- B) Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico negli ultimi tre mesi;
- C) Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico nell'ultimo mese;

### 9. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linee di attività in cui ad ogni infermiere sono assegnate specifiche prestazioni prende il nome di:

- A) Modello per intensità di cura;
- B) Modello per piccole équipes;
- C) Modello tecnico o per compiti;

### 10. Tutti i seguenti sono fattori di rischio estrinseci per le cadute, tranne:

- A) Pavimenti e scale scivolosi;
- B) Deterioramento dello stato mentale;
- C) Bagni senza supporti per sollevarsi dal WC o per fare la doccia;

PROVA SCRITTA

*Carofede*

*Erika H...*  
*M. de K...*



**11. Il rischio clinico è:**

- A) Una condizione clinica che necessita di cure urgenti;
- B) La probabilità che un paziente subisca un danno o disagio imputabili, anche se in modo involontario, alle cure sanitarie prestate;
- C) Il rischio a cui vanno incontro gli operatori sanitari;

**12. Nella rilevazione del polso radiale, il grado di escursione sfigmica della parete del vaso è definito come:**

- A) Ampiezza;
- B) Durezza;
- C) Forza;

**13. Quali sono le scale di valutazione del rischio di Lesioni da Pressione?**

- A) Norton, Braden, Conley, Tinetti;
- B) Norton, Norton Plus, Conley, Braden;
- C) Norton, Norton Plus, Braden, Waterlow;

**14. Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti è consentito:**

- A) Penna indelebile e, in caso di errore, si annulla la pagina riscrivendo la somministrazione nella pagina successiva da controfirmare;
- B) Penna indelebile e, in caso di errore, si barra con la penna sulla scritta (in modo da consentire la lettura sottostante) e controfirmare e datare al fianco della correzione;
- C) Penna indelebile e, in caso di errore, si cancella con bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta e controfirmare al fianco della correzione;

**15. L'insufficienza renale in genere ha una lenta progressione: quali sono gli indicatori che denotano un completo esaurimento della funzionalità renale?**

- A) Riduzione del filtrato glomerulare al di sotto dei 10 ml/min;
- B) Complicanze uremiche;
- C) Entrambe le precedenti;

**16. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche esercita sui professionisti iscritti:**

- A) Il potere penale;
- B) Il potere disciplinare;
- C) Nessuna forma di controllo;

**17. La dieta ipopurinica è indicata in caso di:**

- A) Gotta;
- B) Cirrosi epatica;
- C) Ipercolesterolemia;

**18. Nell'ostruzione delle vie biliari a livello del coledoco, le feci si presentano:**

- A) Picee;
- B) Giallastre;
- C) Bianche e/o grigiastre;

**19. Cosa si intende per "Frazione di Eiezione"?**

- A) È la frazione di sangue che il cuore pompa, dal ventricolo sinistro, durante la sistole;
- B) È la frazione di sangue risultante dopo la centrifugazione in laboratorio;
- C) È la frazione o porzione di sangue di riempimento durante la diastole;

**20. Tra i componenti essenziali della prescrizione farmacologica rientrano:**

- A) Nome e cognome completo del paziente, nome del farmaco da somministrare, dosaggio del farmaco, via di somministrazione, frequenza di somministrazione;
- B) Nome e cognome completo del paziente, nome del farmaco da somministrare, dosaggio del farmaco, via di somministrazione, casa farmaceutica;
- C) Nome e cognome completo del paziente, dosaggio del farmaco, controindicazioni alla somministrazione;



**21. Tra le precauzioni aggiuntive di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 vi sono:**

- A) L'utilizzo corretto dei DPI;
- B) L'adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione;
- C) Entrambe le precedenti;

**22. I suoni di Korotkoff:**

- A) Si auscultano nella rilevazione della pressione arteriosa;
- B) Si auscultano in caso di polmonite ab ingestis;
- C) Si auscultano nelle bronchioliti asmatiche;

**23. Il polso popliteo è palpabile:**

- A) Dietro al ginocchio;
- B) Sul dorso del piede;
- C) Nessuna delle precedenti;

**24. In sanità pubblica, cosa sono i LEA?**

- A) Livelli essenziali di aiuto;
- B) Livelli essenziali di assistenza;
- C) Nessuna delle precedenti;

**25. La terapia con ferro può causare:**

- A) Complicanze solo se somministrata per via orale;
- B) Ipertensione arteriosa;
- C) Disturbi gastrointestinali;

**26. Alla figura dell'OSS è possibile:**

- A) Delegare compiti e mansioni;
- B) Attribuire compiti semplici e ripetibili e inerenti il mansionario specifico;
- C) Assegnare la somministrazione della terapia;

**27. Quale tra le seguenti è una scala per l'individuazione dei pazienti a rischio di Lesioni da Pressione (LDP)?**

- A) Glasgow;
- B) Barthel;
- C) Braden;

**28. Analizzare la seguente comunicazione inefficace:**

*Persona assistita* "Non ne posso più di questa situazione, vorrei morire!"

*Infermiere* "Su, su, non si preoccupi, vedrà che andrà tutto per il verso giusto!"

**L'Infermiere adotta una modalità comunicativa di:**

- A) Rassicurazione;
- B) Banalizzazione;
- C) Generalizzazione;

**29. Le più efficaci misure di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono:**

- A) L'igiene delle mani con acqua e sapone e/o con soluzioni/gel a base alcolica, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani e praticare l'igiene respiratoria;
- B) Indossare la mascherina chirurgica, praticando l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina, ed evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
- C) Entrambe le precedenti;

**30. Che cosa si intende per lussazione?**

- A) Stiramento di un muscolo degli arti superiori;
- B) Perdita di contatto tra i capi articolari;
- C) Anomalia congenita dell'anca;

PROVA ESAMINIA *Qaweddeh Er...* *Nid V. G. F...*



## PROVA SCRITTA N. 2

### 1. Quali sono le principali complicanze croniche del diabete mellito?

- A) Neuropatia, nefropatia, retinopatia, malattie cardiovascolari, piede diabetico, complicanze in gravidanza;
- B) Coma ipoglicemico, neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, glaucoma;
- C) Infarto, scompenso cardiaco. Ictus, piede diabetico, coma chetoacidotico;

### 2. Quando l'allattamento materno è sconsigliato?

- A) HIV, TBC (in trattamento), chemioterapia;
- B) HIV, diabete gestazionale, antibiotico terapia;
- C) HIV, TBC, bambino sottopeso;

### 3. La prevenzione secondaria a chi è rivolta?

- A) Soggetto sano;
- B) Soggetto sintomatico;
- C) Soggetto malato o ad alto rischio;

### 4. Per sterilizzazione si intende:

- A) La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni;
- B) Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti;
- C) Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microrganismi viventi e di altri agenti biologici, comprese le spore;

### 5. Sono disturbi della diuresi:

- A) Pollacchiuria, anuria, poliuria, oliguria;
- B) Anuria, disuria, poliuria, oliguria;
- C) Poliuria, anuria, oliguria;

### 6. Qual è l'obiettivo principale della scala di valutazione del dolore?

- A) Impostare una terapia mirata;
- B) Misurare il dolore e, di conseguenza, procedere ad alleviarlo/eliminarlo;
- C) Valutare il grado di sopportazione del dolore;

### 7. Quale delle seguenti situazioni può configurare ipotesi di responsabilità professionale colposa?

- A) Mancato rispetto del codice deontologico;
- B) Mancato rispetto dei regolamenti e delle procedure aziendali;
- C) Comportamento negligente, imprudente, imperito;

### 8. Per l'esame della glicosuria è necessario:

- A) Un prelievo di sangue a digiuno;
- B) Un campione di urine, prelevato dalla prima minzione mattutina;
- C) Somministrare un carico orale di glucosio;

### 9. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in cui l'Infermiere prende in carico totalmente il paziente e ne è responsabile durante la durata della degenza prende il nome di:

- A) Modello per piccole équipe;
- B) Modello Primary Care;
- C) Modello Case Manager;

### 10. Le più efficaci misure di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono:

- A) L'igiene delle mani con acqua e sapone e/o con soluzioni/gel a base alcolica, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani e praticare l'igiene respiratoria;
- B) Indossare la mascherina chirurgica, praticando l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina, ed evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
- C) Entrambe le precedenti;

*Caro* Enrico  
N. 13/13

PROVA NON ESTIMATA



**11. Come si misura il rischio di cadute del paziente?**

- A) Scala di Conley;
- B) Scala di Norton;
- C) Nessuna Scala;

**12. Che cos'è un evento sentinella?**

- A) Un segnale che avverte che è stato commesso un errore;
- B) Il verificarsi di un fatto che rivela una criticità nel sistema;
- C) Un segnale che avverte che si spende troppo rispetto alla patologia di cui è affetto il paziente;

**13. Nell'ECG si distinguono:**

- A) Onda P, complesso T, onda RS;
- B) Complesso QRS, onda SA, onda T;
- C) Onda P, complesso QRS, onda T;

**14. Come si classificano le Lesioni da Pressione?**

- A) Stadiazione secondo NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel);
- B) Applicazione della Scheda di Braden;
- C) Applicazione della scheda MNA (Mini Nutritional Assessment);

**15. Le norme d'uso del registro di carico/scarico delle sostanze stupefacenti individuano nel Coordinatore Infermieristico:**

- A) L'incaricato della buona conservazione del registro;
- B) Il responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti;
- C) Colui che accerta, attraverso periodiche ispezioni, la corretta tenuta del registro di carico e scarico del reparto;

**16. Quale fra queste patologie causano l'insufficienza renale cronica (IRC)?**

- A) Malattie nefrovascolari e diabete;
- B) Glomerulonefriti;
- C) Entrambe le precedenti;

**17. Se un Infermiere non rispetta le norme deontologiche è punibile:**

- A) Dal Medico di Guardia;
- B) Dall'Ordine Professionale;
- C) Dal Responsabile del servizio d'ordine;

**18. I cibi maggiormente ricchi di proteine sono:**

- A) Frutta, pesce, latte, uova, legumi;
- B) Carne, latte, pesce, ortaggi;
- C) Latte, pesce, uova, carne, legumi;

**19. Quale patologia ha come sintomo caratteristico la diarrea ad "acqua di riso"?**

- A) Diabete;
- B) Colera;
- C) Varicella;

**20. Per cardiopatia ischemica si intende:**

- A) Apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco;
- B) Un sinonimo di afasia;
- C) Una patologia ortopedica;

**21. Nella somministrazione dei farmaci, la via orale è:**

- A) La via di somministrazione migliore per l'antibiotico terapia;
- B) La via di somministrazione migliore per i diuretici;
- C) La via di somministrazione indicata quando il paziente è in grado di deglutire ed assorbire i farmaci per via enterale;

NOVA NON ESTRATTA

Assessore C. L. ...  
M. S. P.



**22. In caso di ostruzione parziale delle vie aeree la manovra di Heimlich:**

- A) Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza;
- B) Non deve essere praticata;
- C) Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente;

**23. Si definisce sincope:**

- A) Una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza;
- B) Un sintomo dell'epilessia;
- C) Un sinonimo di ipotermia;

**24. Tra le precauzioni aggiuntive di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 vi sono:**

- A) L'utilizzo corretto dei DPI;
- B) L'adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione;
- C) Entrambe le precedenti;

**25. Che cosa è l'area precordiale?**

- A) Un'area dei polmoni a ridosso degli alveoli;
- B) L'area al di sopra del cuore, nella parte anteriore del torace;
- C) L'area delle corde vocali;

**26. La legge n. 42 del 1999, all'articolo 1:**

- A) Sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" con "professione sanitaria";
- B) Sostituisce la denominazione "infermiere professionale" con "personale sanitario";
- C) Nessuna delle precedenti;

**27. Le fiale di KCL devono essere conservate:**

- A) In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco Pericoloso";
- B) Chiuse a chiave nella cassaforte dei "Farmaci Stupefacenti";
- C) Insieme ai farmaci per uso parenterale;

**28. Chi è il responsabile dell'operato assistenziale dell'OSS?**

- A) L'Infermiere;
- B) L'OSS stesso;
- C) Il Direttore di Unità Operativa;

**29. Analizzare la seguente comunicazione efficace:**

*Persona assistita* "Sono proprio indeciso, non so come farò a superare questa situazione!"

*Infermiere* "Che cosa pensa sia meglio fare in questo momento?"

**Quale tecnica adotta questo infermiere?**

- A) Rispecchiamento;
- B) Focalizzazione;
- C) Verifica consensuale;

**30. Cos'è il Sistema CPAP di Boussignac?**

- A) Una maschera per somministrare Ossigeno ad alti flussi;
- B) Sistema di ventilazione non invasivo leggero;
- C) Sistema di ventilazione invasiva;

PROVA NON ESTRATTA

Nick B. B. fur

avvedute

Enrico M.



*Handwritten initials and signature*

## PROVA SCRITTA N. 3

### 1. Quali sono le complicanze acute del Diabete di tipo 1?

- A) Coma chetoacidotico, retinopatia, nefropatia, ipoglicemia acuta, coma ipoglicemico;
- B) Coma chetoacidotico, retinopatia, nefropatia, coma ipoglicemico;
- C) Tremori diffusi, vertigini, coma chetoacidotico, chetoacidosi diabetica;

### 2. Cosa significa allattamento materno esclusivo?

- A) Solo latte materno senza alcuna aggiunta;
- B) Solo latte materno e acqua;
- C) Solo latte materno e soluzione glucosata;

### 3. Qual è lo scopo della prevenzione terziaria?

- A) Evitare il più possibile le complicanze, le probabilità di recidive e la morte;
- B) Identificare i soggetti asintomatico di una specifica malattia;
- C) Identificare i soggetti malati di una specifica malattia;

### 4. Per decontaminazione si intende:

- A) La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni;
- B) Il complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti;
- C) La riduzione della carica microbica, fondamentalmente il dimezzamento del numero di microrganismi senza però azzerarli completamente;

### 5. Che cos'è l'anuria?

- A) L'emissione d'urina, da parte dell'apparato urinario, inferiore a 100 ml al giorno, quantità considerata minima accettabile;
- B) L'incapacità a svuotare completamente la vescica a causa di alterazioni a carico dello sfintere uretrale o del muscolo detrusore;
- C) La necessità di urinare più volte durante il giorno, di notte, o in entrambi i momenti, ma in volumi normali o inferiori al normale;

### 6. Che cosa si intende per terapia del dolore?

- A) Una disciplina della medicina che si occupa della diagnosi e della cura del paziente affetto da sintomatologia dolorosa acuta e cronica, benigna o neoplastica;
- B) Una disciplina della medicina che si occupa della diagnosi e della cura del paziente affetto da sintomatologia dolorosa neoplastica;
- C) Una disciplina della medicina che si occupa della cura del paziente sottoposto ad intervento chirurgico;

### 7. Per l'Infermiere si parla di responsabilità per *culpa in vigilando* nel caso di:

- A) Danni procurati da coloro che agiscono sotto la responsabilità dell'Infermiere;
- B) Danni procurati da altri professionisti che assistono il paziente (es. Fisioterapista);
- C) Nessuna delle precedenti;

### 8. La raccolta di urine delle 24 ore richiede:

- A) Tecnica sterile;
- B) Tecnica pulita con guanti sterili;
- C) Che il periodo di raccolta inizi al mattino, dopo la prima minzione e termini la mattina del giorno successivo con la prima minzione del mattino;

### 9. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro che prevede l'erogazione dell'assistenza ad un gruppo di pazienti da parte di specifici infermieri per turno prende il nome di:

- A) Modello per intensità di cura;
- B) Modello per piccole équipe;
- C) Modello tecnico o per compiti;

PROVA NON ESTRATTA

*Handwritten signature*





3  
A  
A1

**10. Le più efficaci misure di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono:**

- A) L'igiene delle mani con acqua e sapone e/o con soluzioni/gel a base alcolica, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani, e praticare l'igiene respiratoria;
- B) Indossare la mascherina chirurgica, praticando l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina, ed evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
- C) Entrambe le precedenti;

**11. Quando deve essere valutato il rischio di caduta?**

- A) All'ammissione del paziente e a intervalli regolari durante il ricovero;
- B) A fronte di variazioni di terapia con farmaci che possono aumentare il rischio di caduta;
- C) Entrambe le precedenti;

**12. L'obiettivo principale dell'Incident Reporting è:**

- A) Raccogliere dati a fini statistici – epidemiologici;
- B) Identificare il rischio e predisporre azioni di miglioramento;
- C) Analizzare i sinistri e gestire il contenzioso;

**13. Le alterazioni della P.A. sono determinate da:**

- A) Gittata cardiaca, resistenza dei vasi e funzionamento del Centro della Pressione Arteriosa;
- B) Resistenza dei vasi, massa circolante e funzionalità del seno atriale;
- C) Gittata cardiaca, resistenza dei vasi, volemia;

**14. Nella cura delle lesioni da pressione è importante:**

- A) Frizionare energicamente la cute con garza e soluzione fisiologica;
- B) Eliminare o attenuare la pressione sulla lesione;
- C) Applicare sempre medicazioni avanzate;

**15. In caso di rottura accidentale di una fiala di sostanza stupefacente o psicotropa si deve:**

- A) Recuperare e conservare la fiala rotta come prova dell'evento;
- B) Smaltire la fiala rotta nell'apposito contenitore per taglienti;
- C) Verbalizzare l'accaduto, scaricare la quantità di medicinale andato disperso, smaltire la fiala rotta nell'apposito contenitore per taglienti;

**16. Per la valutazione della funzionalità renale quale dei seguenti esami è più attendibile?**

- A) Creatininemia;
- B) Amilasemia;
- C) Lipasemia;

**17. L'oggetto di studio della disciplina infermieristica è:**

- A) L'uomo e le sue patologie;
- B) L'uomo e il suo bisogno di assistenza infermieristica;
- C) L'uomo e il suo stato sociosanitario;

**18. Per favorire l'acidificazione delle urine si devono assumere:**

- A) Agrumi e mirtilli;
- B) Crucifere;
- C) Latticini;

**19. Le feci acoliche sono indice di:**

- A) Malassorbimento;
- B) Ostruzione del tratto biliare;
- C) Infezione da Escherichia Coli;

**20. Sono fattori di rischio cardiovascolari:**

- A) Ipercolesterolemia e obesità;
- B) Alimentazione ricca di fibre;
- C) Nessuna delle precedenti;



PROVA NON ESTRAITA

*Carlo...*  
*...*

*Carlo...*





Handwritten initials: D, A, R, A

- 21. Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?**  
A) Insulina;  
B) Farmaci irritanti;  
C) Farmaci diuretici;
- 22. Il rilievo della pressione dell'arteria polmonare è possibile soltanto:**  
A) Negli interventi di cardiocirurgia e chirurgia toracica;  
B) Attraverso il catetere di Swan Ganz o similari;  
C) Con una particolare apparecchiatura denominata IABP;
- 23. Nel caso di ipercapnia:**  
A) È indicata l'O<sub>2</sub> terapia ad alti flussi;  
B) È indicata l'O<sub>2</sub> terapia ad alti flussi intermittente;  
C) È indicata l'O<sub>2</sub> terapia a bassi flussi;
- 24. Tra le precauzioni aggiuntive di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 vi sono:**  
A) L'utilizzo corretto dei DPI;  
B) L'adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione;  
C) Entrambe le precedenti;
- 25. Durante il monitoraggio Holter il paziente deve:**  
A) Eseguire attività fisica per due ore al giorno;  
B) Assumere antipertensivi;  
C) Condurre una vita normale;
- 26. L'acronimo SDO si riferisce:**  
A) Alla scheda di dimissione ospedaliera;  
B) Alla scheda di descrizione dell'iter diagnostico, terapeutico e assistenziale per patologia;  
C) Alla scheda per la raccolta dati anagrafici del paziente;
- 27. La terapia marziale va assunta:**  
A) A digiuno;  
B) A stomaco pieno;  
C) Prima di andare a letto;
- 28. Nell'acidosi metabolica a quale respiro patologico si assiste?**  
A) Respiro di Cheyne -Stokes;  
B) Respiro di Kussmaul;  
C) Respiro di Biot;
- 29. La teoria della comunicazione che ha affermato che " non si può non comunicare" è:**  
A) La teoria cibernetica;  
B) L'analisi transazionale;  
C) La pragmatica della comunicazione;
- 30. L'OSS è una figura di supporto all'assistenza nel settore:**  
A) Penitenziario;  
B) Sociosanitario;  
C) Delle residenze sanitarie per anziani e/o disabili;

PROVA NON ESTRATTA

Handwritten signature: *Carlo...*





## PROVA PRATICA N. 1

**1. In caso di puntura o taglio accidentale con strumento sporco di sangue quale tra i seguenti comportamenti devono essere adottati?**

- A) Recarsi con immediatezza in Pronto Soccorso;
- B) Procedere con l'antisepsi, avvisare i colleghi e recarsi in Pronto Soccorso;
- C) Aumentare il sanguinamento, detergere, asciugare, effettuare l'antisepsi, avvisare il Medico di reparto ed i colleghi e recarsi in Pronto Soccorso;

**2. Per una corretta effettuazione della Manovra di Heimlich è necessario che la persona adulta vittima di soffocamento sia:**

- A) In posizione laterale di sicurezza;
- B) Supina, su un piano rigido;
- C) In piedi;

**3. L'aspirazione endotracheale deve durare:**

- A) Non meno di 20 secondi;
- B) Almeno 25-30 secondi;
- C) Non più di 10-15 secondi;

**4. Quale tra le seguenti posizioni si fa assumere ad una persona cardiopatica con dispnea e edemi declivi:**

- A) Posizione di Trendelenburg;
- B) Posizione di Sims;
- C) Posizione ortopnoica;

**5. Una lesione da pressione classificata di II stadio:**

- A) Non presenta alcun segno osservabile;
- B) È caratterizzata da eritema senza soluzione di continuo della cute;
- C) È caratterizzata da una lesione superficiale della cute;

**6. Nell'effettuazione di un prelievo venoso dall'arto superiore è, generalmente, preferibile utilizzare quali dei seguenti vasi:**

- A) Ulnare e radiale;
- B) Cubitale mediana e basilica;
- C) Femorale e cubitale mediana;

**7. Per somministrare Alprazolam 0,125 mg quante compresse da 0,25 mg occorrono?**

- A) Due compresse;
- B) Una più mezza;
- C) Mezza compressa;

**8. Le compresse con rivestimento gastroresistente:**

- A) Non devono essere triturate o masticate;
- B) Devono essere triturate o masticate;
- C) Possono essere triturate/masticate in base alla preferenza dell'assistito;

**9. A quale apparecchiatura elettromedicale si riferisce l'acronimo DAE?**

- A) Elettrobisturi;
- B) Aspiratore;
- C) Defibrillatore;

**10. Per effettuare un tampone naso-faringeo ad un assistito con sintomatologia riconducibile a Covid-19, quale dispositivo di protezione individuale deve essere indossato?**

- A) Mascherina chirurgica, camice sterile, guanti sterili, copricapo;
- B) Guanti non sterili, FFP2/FFP3, visiera, copricapo, camice idrorepellente;
- C) Normale divisa di lavoro, mascherina chirurgica e guanti;



**11. Il paziente non è cosciente, respira, ha segni di circolo:**

- A) Si allerta il NUE 112 e si iniziano le procedure di defibrillazione;
- B) Si iniziano le compressioni toraciche;
- C) Si posiziona il paziente in posizione laterale di sicurezza;

**12. La pinza anatomica è una pinza generalmente impiegata per manipolare tessuti molli, la scelta della sua dimensione dipende dalla finalità chirurgica e dalla profondità in cui si deve agire; per definizione si considera una pinza:**

- A) Traumatica;
- B) Da dissezione;
- C) Atraumatica;

**13. Farmaci LASA: individuare l'affermazione errata:**

- A) Bisogna conservare in maniera separata i farmaci Look Alike Sound Alike (LASA);
- B) Bisogna conservare insieme i farmaci Look Alike Sound Alike (LASA) e segnalarli all'ATS di riferimento perché illegali;
- C) I farmaci Look Alike Sound Alike (LASA) sono farmaci che possono essere scambiati per somiglianza di confezionamento, di nome o di pronuncia;

**14. Durante l'inserimento del sondino nasogastrico il paziente deve essere istruito a:**

- A) Assumere la posizione supina e tossire al passaggio del sondino;
- B) Tenere il capo inclinato in avanti e deglutire al passaggio del sondino;
- C) Tenere il capo esteso all'indietro e deglutire al passaggio del sondino;

**15. Nella gestione della medicazione del sito di inserimento del CVC è importante:**

- A) Utilizzare tecniche differenziate per il sito settico da quello pulito;
- B) Cambiare quotidianamente la medicazione;
- C) Utilizzare tecniche asettiche per cambiare la medicazione;

**16. Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere, di norma, prelevato:**

- A) Almeno un'ora dopo un episodio di innalzamento della temperatura corporea;
- B) Solo se la temperatura corporea supera i 39° C;
- C) Durante un episodio di innalzamento della temperatura corporea;

**17. Nell'ECG tradizionale si utilizzano:**

- A) 12 elettrodi 6 precordiali e 6 periferici;
- B) 10 elettrodi 6 precordiali e 4 periferici;
- C) 12 elettrodi 7 precordiali e 5 periferici;

**18. Per la valutazione dello stato di coscienza quale delle seguenti Scale si deve usare?**

- A) GCS;
- B) PAINAD;
- C) ABBEY;

**19. La quantità massima di farmaco iniettabile per via intramuscolare in sede glutea è:**

- A) 0,5 ml;
- B) 5 ml;
- C) 10 ml;

**20. L'educazione terapeutica che l'Infermiere esplica si deve normalmente rivolgere a:**

- A) Il paziente;
- B) Al caregiver;
- C) Entrambe le precedenti;



## PROVA PRATICA N. 3



**1. Quando si parla con un paziente afasico:**

- A) Bisogna utilizzare domande a risposta aperta;
- B) Bisogna parlare velocemente;
- C) È utile richiedere conferma di quanto abbiano capito;

**2. Quale tra le seguenti posizioni è preferibile far assumere al paziente da sottoporre a paracentesi?**

- A) Posizione di Trendelenburg o Antitrendelenburg;
- B) Posizione seduta o decubito laterale sinistro;
- C) Far scegliere al paziente la posizione che preferisce;

**3. Quale tra questi può essere considerato un vantaggio della somministrazione di farmaci mediante il sondino nasogastrico?**

- A) L'invasività;
- B) Il rischio che il sondino naso-gastrico non sia in sede gastrica;
- C) La somministrazione per via enterale in pazienti in coma, affetti da patologie esofagea o che non possono deglutire;

**4. In caso di prelievo di un campione di sangue venoso ad un paziente con arto plegico:**

- A) Prediligere l'arto controlaterale;
- B) Prediligere le vene della mano;
- C) Prediligere l'arto plegico;

**5. L'Infermiere deve raccogliere dei campioni per un'emocoltura. Quanti set dovrebbe raccogliere?**

- A) 10 set;
- B) 2 flaconi, entrambi per coltura batterica di anaerobi;
- C) Diversi set: di solito sono adeguati 2 set eseguiti simultaneamente o in rapida successione a distanza di 5-10 minuti;

**6. Per la somministrazione dei farmaci è requisito essenziale per l'Infermiere:**

- A) La prescrizione medica;
- B) Il consenso di un caregiver del paziente;
- C) Un corso post-laurea di un mese con rilascio del documento abilitante;

**7. Le seguenti affermazioni si riferiscono ai farmaci "campione"; una sola è corretta, quale?**

- A) In ambito ospedaliero sono illegali e non devono essere utilizzati dai Medici e dagli Infermieri, salvo in rari casi;
- B) Devono prevedere la dicitura "Campione gratuito – vietata la vendita";
- C) Devono essere conservati insieme a tutti gli altri farmaci e possono essere consegnati dai medici autorizzati a prescriberli da informatori farmaceutici e dal Coordinatore Infermieristico;

**8. Per effettuare un tampone naso-faringeo ad un assistito con sintomatologia riconducibile a Covid-19, quali dispositivi di protezione individuale si indossano:**

- A) Mascherina chirurgica, camice sterile, guanti sterili, copricapo;
- B) Guanti non sterili, FFP2/FFP3, camice idrorepellente, visiera, copricapo;
- C) Normale divisa di lavoro, mascherina chirurgica e guanti;

**9. Con il termine di disfagia si intende:**

- A) Avversione per i cibi;
- B) Difficoltà alla deglutizione;
- C) Senso di fame insaziabile;

**10. Cosa significa emottisi?**

- A) Emissione di sangue proveniente dalle vie respiratorie;
- B) Emissione di sangue con le feci;
- C) Emissione di sangue dal naso;

PROVA NON ESTRATA

Michela Tuzi  
Alto Lario

Olivero Guller



**11. Il Pap-test è un test di screening per tumori:**

- A) Della cervice uterina;
- B) Della mammella;
- C) Della prostata;

**12. Per D.P.I. si intende:**

- A) Dispositivo personale igienico;
- B) Dispositivo protezione individuale;
- C) Dispositivo pubblico di infezione;

**13. La Scala di Norton è:**

- A) Uno strumento per individuare pazienti a rischio di lesioni cutanee da pressione;
- B) Una scala che valuta il fabbisogno di personale infermieristico;
- C) Uno strumento di rilevazione del danno sensoriale di un paziente;

**14. Nel paziente con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l'applicazione delle calze elastiche, deve avvenire:**

- A) Dopo aver camminato;
- B) Prima di alzarsi dal letto al mattino;
- C) Tutte le volte che sente le gambe appesantite;

**15. La disidratazione è caratterizzata da:**

- A) Ipotensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia;
- B) Ipertensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia;
- C) Ipotensione, secchezza della cute, bradicardia, oliguria;

**16. Il set di infusione di un catetere venoso periferico va sostituito:**

- A) Dopo 72 ore;
- B) Ogni 24/48 ore;
- C) Ad ogni cambio di infusione;

**17. Quale dei seguenti fattori non rappresenta un ostacolo per la rilevazione della percentuale di saturazione dell'ossigeno con saturimetro?**

- A) Intossicazione da monossido di carbonio;
- B) Cute fredda;
- C) Iperpiressia;

**18. Prima di essere sottoposto a paracentesi è necessario che il paziente:**

- A) Beva molta acqua
- B) Beva molta acqua e trattenga le urine
- C) Svuoti la vescica

**19. Indicare l'aspetto errato nelle seguenti misure preoperatorie efficaci per ridurre le infezioni della ferita chirurgica:**

- A) Trattamento di tutte le infezioni presenti, anche se localizzate lontano dalla sede dell'incisione chirurgica;
- B) Riduzione della degenza perioperatoria;
- C) Tricotomia dell'area del campo operatorio;

**20. Per l'esecuzione di un enteroclistma di 500/600 ml di liquido la persona deve essere posta preferibilmente in decubito:**

- A) Laterale destro con ginocchio destro flesso;
- B) Laterale sinistro con ginocchio sinistro flesso;
- C) Laterale sinistro con ginocchio destro flesso;

PROVA NON ESTREATA

Michela Tuzi

Alberini

Elisabetta Geronzi



## PROVA PRATICA N. 2



**1. Dopo una trasfusione di sangue incompatibile il paziente presenta:**

- A) Reazione emolitica;
- B) Complicanze infettive;
- C) Disidratazione e secchezza delle fauci;

**2. Quando si introduce un sondino nasogastrico:**

- A) Si deve far bere un bicchiere di acqua e invitare il paziente a deglutire più volte;
- B) Si deve dire al paziente di non respirare;
- C) Si deve sottoporre il paziente ad anestesia generale;

**3. Se all'assistito è stato impiantato un Catetere Venoso Centrale ad inserzione centrale, l'Infermiere può considerare sempre il suo utilizzo per la raccolta di un campione di emocoltura:**

- A) L'affermazione è corretta;
- B) L'affermazione è errata;
- C) L'affermazione non è propriamente corretta. Infatti, il rischio di falsi positivi da prelievo da catetere venoso centrale è più elevato, per questo non vanno usati di routine ma solo quando la venipuntura periferica è impossibile o quando si cerca di diagnosticare un'infezione catetere correlata;

**4. Nell'effettuare un tampone nasofaringeo ad un assistito con sintomatologia riconducibile a Covid-19, quali dispositivi di protezione individuale si indossano?**

- A) Mascherina chirurgica, guanti sterili, camice sterile, copricapo;
- B) Guanti non sterili, FFP2/FFP3, camice idrorepellente, visiera, copricapo;
- C) Normale divisa di lavoro, mascherina chirurgica e guanti;

**5. Nell'ambito della gestione dei farmaci e delle scorte, la regola "First in First out" prevede:**

- A) La collocazione del farmaco con scadenza più vicina davanti (sarà il primo ad essere utilizzato);
- B) La suddivisione dei farmaci per formula orale;
- C) La suddivisione dei farmaci per numeri di lotto;

**6. Nella cura della lesione da pressione è fondamentale e irrinunciabile:**

- A) Massaggiare l'area interessata con sostanza saponosa;
- B) Applicare garze grasse sulla lesione;
- C) Eliminare/Ridurre la pressione sulla lesione;

**7. Per la rimozione di corpi estranei ostruenti le prime vie aeree in un soggetto adulto, si esegue:**

- A) Le Manovre di BLS;
- B) La Manovra di Heimlich;
- C) La tracheotomia;

**8. Indicare quale accesso venoso è preferibile per l'introduzione di un CVC:**

- A) Femorale;
- B) Safena;
- C) Succlavia;

**9. Prima di sottoporre il paziente a toracentesi è necessario:**

- A) Rilevare i parametri vitali;
- B) Somministrare molti liquidi per os e far trattenere le urine;
- C) Applicare il catetere vescicale al paziente;

**10. La rilevazione della temperatura corporea orale è controindicata per quali soggetti?**

- A) Neonati, bambini e pazienti incoscienti;
- B) Pazienti affetti da BPCO;
- C) Pazienti che abbiano avuto crisi respiratorie;

PROVA NON ESTRATTA

Alfredo Fugatti

Alfredo Fugatti

Alfredo Fugatti



**11. La posizione laterale di sicurezza di un paziente è indicata in caso di:**

- A) Infarto miocardico acuto;
- B) Trauma agli arti inferiori;
- C) Perdita di coscienza;

**12. Quale delle seguenti sostanze antisettiche è da utilizzarsi nella gestione del sito del catetere venoso centrale?**

- A) Ammonici quaternari in soluzione alcolica al 25%;
- B) Clorexidina al 2%;
- C) Perossido di idrogeno al 3%;

**13. Nella scelta del CV relativamente al CALIBRO è corretto:**

- A) Utilizzare il minor calibro possibile compatibilmente con un adeguato drenaggio delle urine;
- B) Utilizzare il maggior calibro possibile così da evitare ostruzioni del catetere;
- C) Utilizzare calibri differenziati sulla base dell'indicazione al cateterismo;

**14. Quante compresse da 0,125 mg di un farmaco si devono somministrare per ottenere 0,25mg di dosaggio?**

- A) 1/2 compressa;
- B) 1 e 1/2;
- C) 2 compresse;

**15. L'errata introduzione del SNG si manifesta con sintomi quali:**

- A) Vomito;
- B) Tosse e cianosi;
- C) Emottisi;

**16. Quali tra i seguenti dati e informazioni occorre conoscere prima di procedere a posizionamenti, cambiamenti posturali e trasferimenti di un paziente?**

- A) Stato di coscienza, capacità di comprensione, livello di dipendenza;
- B) Diagnosi medica, diagnosi mediche secondarie e motivo del ricovero;
- C) Entrambe le precedenti;

**17. I farmaci oftalmici:**

- A) Possono essere somministrati nell'occhio utilizzando instillazioni o irrigazioni;
- B) Possono essere somministrati nella mucosa orale in caso di mucosite;
- C) Possono essere somministrati nella mucosa nasale;

**18. Prima di sottoporsi ad una radiografia il paziente:**

- A) Deve essere idratato con almeno 1000 ml di liquidi;
- B) Deve essere a digiuno;
- C) Nessuna delle precedenti;

**19. Quando si indossano i guanti:**

- A) Le mani devono essere lavate solo se si eseguono procedure sterili;
- B) Non è necessario lavare le mani;
- C) Le mani devono essere lavate prima e dopo averli indossati;

**20. Per la corretta instillazione di gocce auricolari in un paziente adulto occorre:**

- A) Sollevare il padiglione auricolare verso l'alto e l'esterno;
- B) Non fare trazioni sul padiglione auricolare;
- C) Inclinare in avanti la testa del paziente;

*Olivero Gullotti*

*Elvira Meri*